




СИБЕРСИЛ®Zn+

СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ КЛОСТРИДИОЗОВ У КРС

Сиберсил®Zn+ - комплексный препарат для повышения сохранности КРС, снижения заболеваемости животных ЖКТ заболеваниями бактериальной этиологии, в том числе клостридиозами. Способствует укреплению иммунитета. Клостридиоз – является одним из распространенных и наиболее опасных заболеваний крупного рогатого скота. Споры клостридии содержатся в почве, откуда попадают в корма. Ввиду круглогодичного стойлового содержания и отсутствие системы «пусто-занято» в помещениях идет накопление бактериального фона, в том числе клостридий. Особенно страдают высокопродуктивные животные, так как насыщенные протеином рационы способствуют быстрому росту клостридии в кишечнике животного, вызывая энтериты и другие опасные заболевания. Несбалансированное кормление, бесконтрольное применение антибиотиков, отсутствие регулярных дезинфекций, корма низкого качества все это факторы провоцирующие клостридиозы.

СОСТАВ

Наименование	Количество
Ферментный комплекс	Активности указаны в удостоверении качества
Пребиотический комплекс	Не менее 20%
Хелатная форма цинка	Не менее 6%
Пробиотический комплекс	Не менее 1*10 ⁸ КОЕ в 1 г препарата
Вспомогательные компоненты	До 100%



СИБЕРСИЛ®Zn+ благодаря своему комплексному составу подавляет колонии патогенных микроорганизмов в том числе клостридий:

1. При попадании в организм животного с кормом пробиотический комплекс препарата, представленный бактериями *Bacillus amyloliquefaciens* трансформируются в вегетативные формы и в процессе жизнедеятельности выделяют продукты метаболизма в виде комплекса ферментов и антибиотикоподобных веществ, оказывающих угнетающий эффект на многие виды патогенных и условно-патогенных бактерий, в том числе клостридий
2. Ионы цинка в сочетании с L-аспарагиновой кислотой быстро усваиваются организмом животного, способствуя восстановлению слизистой кишечника, что увеличивает защитный барьер на пути кишечных инфекций. Кроме того, цинк положительно влияет на метаболические процессы в организме животного
3. Комплекс пребиотиков, состоящий из маннаноолигосахаридов и клеточных стенок дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*, способствует связыванию и выведению из организма патогенной микрофлоры, свободных радикалов, токсинов, стимулирует рост и развитие собственной микрофлоры рубца и кишечника улучшая процессы пищеварения и укрепляя иммунитет
4. Ферментный комплекс, обладает свойством разрушения биопленок патогенных микроорганизмов, благодаря чему нивелируется фактор патогенности, бактерии перестают создавать колонии и оказывать негативное влияние на организм животного.

Таким образом при применении Сиберсил®Zn+ достигается комплексный эффект профилактики инфекций бактериальной этиологии, происходит укрепление иммунитета, что в свою очередь положительно сказывается на продуктивности и сохранности животных.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

При наличии проблематики связанной с клостридиозами и другими бактериальными инфекциями препарат применяется курсами по 10-14 дней ежемесячно.

В случае скармливания кормов низкого качества, с большим процентом масляной кислоты препарат рекомендуется применять ежедневно.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Телята 0-6 мес.	10-20 г/гол/сутки
Молодняк 6-18 мес.	30-60 г/гол/сутки
Лактирующие и сухостойные коровы	50-100 г/гол/сутки

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от - 25°C до +25°C
Срок хранения: 12 месяцев с даты производства
Упаковка: 20 кг в полиэтиленовые мешки, вложенные в тканые мешки из полипропилена.



КОРМОВЫЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ МИКРОБНОГО СИНТЕЗА, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ КРС

Наименование средства	Назначение	Дозировка и способ применения
Кормомикс®СОРБ Сорбент нейтрализатор микотоксинов	Связывание и выведение широкого спектра токсинов. Повышение продуктивности	Путем введения в комбикорма 10 г/гол/сутки (телята 0-6 мес.), 20 г/гол/сутки (молодняк 6-18 мес.), 30-50 г/гол/сутки (лактрующие и сухостойные коровы, нетели)
Кормомикс®СОРБ ЭКО Сорбент нейтрализатор микотоксинов	Связывание микотоксины, присутствующие в кормах	Путем введения в комбикорма 20-30 г/гол/сутки (молодняк 6-18 мес.), 50-100 г/гол/сутки (лактрующие и сухостойные коровы, нетели)
Кормомикс®МОС Пребиотик, сорбент патогенной микрофлоры	Повышение продуктивности. Профилактика заболеваний ЖКТ	Путем введения в комбикорма 10 г/гол/сутки (телята 0-6 мес.), 20 г/гол/сутки (молодняк 6-18 мес., лактирующие коровы, сухостойные коровы, нетели)
Кормомикс®АНТИ-ТОКС Сорбент нейтрализатор микотоксинов	Снижение негативного влияния микотоксинов на организм крупного рогатого скота	Путем введения в комбикорма 5-10 г/гол/сутки (телята 0-6 мес.), 10-20 г/гол/сутки (молодняк 6-18 мес.), 20-30 г/гол/сутки (лактрующие коровы)
Кормомикс®ЭНЗИМ Активатор рубцового пищеварения	Повышение продуктивности. Повышение переваримости кормов профилактика ацидоза	Путем введения в комбикорма 20 г/гол/сутки (молодняк 6-18 мес., 25-50 г/гол/сутки (лактрующие коровы), 25-75 г/гол/сутки (сухостойные коровы, нетели)
Кормомикс®РУМИН Синбиотик	Повышение продуктивности. Профилактика колибактериоза и клостридиоза	Путем введения в комбикорма или молоко и ЗЦМ 10 г/гол/сутки (телята 0-6 мес.), 20 г/гол/сутки (молодняк 6-18 мес.), 25-50 г/гол/сутки (лактрующие коровы), 25-75 г/гол/сутки (сухостойные коровы, нетели)
Кормомикс®АНТИСТРЕСС	Снижения стресс-факторов, в том числе теплового стресса у животных	Путем введения в комбикорма 30-60 г/гол/сутки (молодняк 6-18 мес.), 50-100 г/гол/сутки (лактрующие коровы)
Сиберсил®Zn+ Профилактика клостридиоза	Снижение негативного влияния патогенной микрофлоры на здоровье крупного рогатого скота	Путем введения в комбикорма 10-20 г/гол/сутки (телята 0-6мес.), 30-60 г/гол/сутки (молодняк 6-18 мес.), 50-100 г/гол/сутки (лактрующие коровы)
Кауджой® Энергетическая кормовая добавка	Профилактика кетоза, родильного пареза. Повышение продуктивности	1 л/день отела в составе водного раствора, далее 7-30 дней, 300 мл/сутки или 100 мл/сутки за 20 дней до отела путем добавления в воду или корм (лактрующие коровы, сухостойные коровы, нетели)
Кауджой®ПЛЮС Энергетическая кормовая добавка	Профилактика кетоза, родильного пареза. Повышение продуктивности	Путем введения в корм в зависимости от возраста 7-120 день, 100-300 г (лактрующие коровы, сухостойные коровы, нетели)

ПРОДУКЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, ИСПОЛЗУЕМАЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ КОРМОПРОИЗВОДСТВА И СОДЕРЖАНИЯ КРС

Наименование средства	Назначение	Дозировки
Биосиб® Жидкий биоконсервант	Применяется для силосования однолетних и многолетних трав и кукурузы, а также зерна повышенной влажности.	Травы и кукуруза.....100 мл/т Зерно.....300 мл/т
Биосиб® Концентрированный жидкий биоконсервант	Применяется для силосования однолетних и многолетних трав и кукурузы.	Травы и кукуруза.....10 мл/т
Биоферм® Полиферментная композиция	Применяется для ускорения процессов силосования бобовых, злаковых трав, их смесей и кукурузы в составе баковой смеси с препаратами Биосиб и Биосиб концентрированный.	Бобовые травы.....100 мл/т Бобово-злаковые смеси..... 60-100 мл/т Злаковые и кукуруза..... 50-100 мл/т
Биосиб®КОМБИ Лиофилизированный биоконсервант	Сочетает в своем составе бактерии, входящие в состав Биосиб и ферменты, входящие в состав Биоферм в лиофильно высушенной форме. Применяется для силосования бобовых, злаковых трав и кукурузы а также зерна повышенной влажности.	Бобовые травы5 г/т Злаковые травы и кукуруза3-5 г/т Зерно повышенной влажности.....15 г/т
Биосиб®АЦИД Биохимический консервант	Применяется для силосования бобовых, злаковых трав и их смесей, кукурузы в условиях повышенной влажности, а также силосования влажного зерна.	Травы и кукуруза.....3-4 л/т (в зависимости от влажности) Зерно..... 3-5 л/т
Феркон П Для обработки подстилки	Применяется для обработки подстилки, лежаков, деревянных полов с целью подавления патогенной микрофлоры, профилактики мастита, колибактериоза и других заболеваний бактериальной этиологии.	1 кг/1000 м² в составе водного раствора
Феркон Д Для обработки навоза	Применяется для ускорения разложения навоза с целью получения из него ценного органического удобрения.	1 кг/30-50 м³ навоза